

Aula 4 Drosófila II

O parassegmentos

Os primeiros sinais visíveis de segmentação no embrião são sulcos transitórios na superfície do embrião após a gastrulação.

O parassegmentos

Os primeiros sinais visíveis de segmentação no embrião são sulcos transitórios na superfície do embrião após a gastrulação.

Esses sulcos definem os parassegmentos.

O parassegmentos

Os primeiros sinais visíveis de segmentação no embrião são sulcos transitórios na superfície do embrião após a gastrulação.

Esses sulcos definem os parassegmentos.

Há 14 parassegmentos -> unidades fundamentais

O parassegmentos

Os primeiros sinais visíveis de segmentação no embrião são sulcos transitórios na superfície do embrião após a gastrulação.

Esses sulcos definem os parassegmentos.

Há 14 parassegmentos -> unidades fundamentais

Cada parassegmento se comporta independentemente, sob o controle de um conjunto específico de genes.

O parassegmentos



Os primeiros sinais visíveis de segmentação no embrião são sulcos transitórios na superfície do embrião após a gastrulação.


Esses sulcos definem os parassegmentos.

Há 14 parassegmentos -> unidades fundamentais

Cada parassegmento se comporta independentemente, sob o controle de um conjunto específico de genes.

Os parassegmentos estão fora de fase em relação aos segmentos






Os genes "pair-rule"

Delimitam os parassegmentos e são expressos em séries de sete faixas transversais ao eixo a-p do embrião


Os genes "pair-rule"

Delimitam os parassegmentos e são expressos em séries de sete faixas transversais ao eixo a-p do embrião




Os genes "pair-rule"

Delimitam os parassegmentos e são expressos em séries de sete faixas transversais ao eixo a-p do embrião




Os genes "pair-rule"

Delimitam os parassegmentos e são expressos em séries de sete faixas transversais ao eixo a-p do embrião



Os genes "pair-rule"

Delimitam os parassegmentos e são expressos em séries de sete faixas transversais ao eixo a-p do embrião



A posição das faixas repetidas dos genes "pair-rule" é estabelecida pelo padrão não repetido dos "gap genes"

Posicionamento das faixas dos "pair-rule"

Mutações nesses genes afetam segmentos alternados

Posicionamento das faixas dos "pair-rule"

Mutações nesses genes afetam segmentos alternados

Alguns deles afetam parassegmentos ímpares (*even-skipped*)

Posicionamento das faixas dos "pair-rule"

Mutações nesses genes afetam segmentos alternados

Alguns deles afetam parassegmentos ímpares (*even-skipped*)

Outros afetam parassegmentos pares (*fushi-tarazu*)

Posicionamento das faixas dos "pair-rule"


Mutações nesses genes afetam segmentos alternados

Alguns deles afetam parassegmentos ímpares (*even-skipped*)


Outros afetam parassegmentos pares (*fushi-tarazu*)

O padrão em faixas dos "pair-rule" surge antes da celularização da blastoderme


Como a 2ª faixa de eve é estabelecida



Como a 2ª faixa de eve é estabelecida




Como a 2ª faixa de eve é estabelecida



em cada faixa os "pair-rule" respondem a diferentes concentrações e combinações dos fatores de transcrição dos "gap-genes".


em cada faixa os "pair-rule" respondem a diferentes concentrações e combinações dos fatores de transcrição dos "gap-genes".

Binding of gap-gene proteins to one of the regulatory regions in the promoter of *even-skipped*



em cada faixa os "pair-rule" respondem a diferentes concentrações e combinações dos fatores de transcrição dos "gap-genes".

Binding of gap-gene proteins to one of the regulatory regions in the promoter of *even-skipped*



região reguladora do gene *even-skipped*, com ~500pb de comprimento, mostra diferentes elementos que controlam a expressão de cada faixa -> *lacZ*

Genes de segmentação e compartimentos

Diferentemente dos "pair-rule" que são todos fatores de transcrição, os genes de segmentação são mais diversos.

Genes de segmentação e compartimentos

Diferentemente dos "pair-rule" que são todos fatores de transcrição, os genes de segmentação são mais diversos.

São expressos em 14 faixas transversais, uma para cada parassegmento.

Genes de segmentação e compartimentos

Diferentemente dos "pair-rule" que são todos fatores de transcrição, os genes de segmentação são mais diversos.

São expressos em 14 faixas transversais, uma para cada parassegmento.

Nesse momento a blastoderme está celularizada e portanto os genes de segmentação agem num ambiente celular.

Genes de segmentação e compartimentos

Diferentemente dos "pair-rule" que são todos fatores de transcrição, os genes de segmentação são mais diversos.

São expressos em 14 faixas transversais, uma para cada parassegmento.

Nesse momento a blastoderme está celularizada e portanto os genes de segmentação agem num ambiente celular.

Um dos genes de segmentação é *engrailed*, expresso na parte anterior de cada parassegmento.

Genes de segmentação e compartimentos

Diferentemente dos "pair-rule" que são todos fatores de transcrição, os genes de segmentação são mais diversos.


São expressos em 14 faixas transversais, uma para cada parassegmento.


Nesse momento a blastoderme está celularizada e portanto os genes de segmentação agem num ambiente celular.

Um dos genes de segmentação é *engrailed*, expresso na parte anterior de cada parassegmento.

engrailed é também um **gene seletor** que continua agindo em estágios posteriores.

Expressão de *engrailed* no embrião de estágio 11





A expressão de *engrailed* é controlada por genes "pair-rule"

A expressão de *engrailed* é controlada por genes "pair-rule"

Mutantes sem *fushi-tarazu* não expressam *engrailed* nos segmentos pares (onde *ftz* é normalmente expresso)

A expressão de *engrailed* é controlada por genes "pair-rule"

Mutantes sem *fushi-tarazu* não expressam *engrailed* nos segmentos pares (onde *ftz* é normalmente expresso)

A margem anterior do parassegmento é o limite de uma **restrição de linhagem celular**

A expressão de *engrailed* é controlada por genes "pair-rule"

Mutantes sem *fushi-tarazu* não expressam *engrailed* nos segmentos pares (onde *ftz* é normalmente expresso)

A margem anterior do parassegmento é o limite de uma **restrição de linhagem celular**

Células de um parassegmento ou seus descendentes nunca se movem para um parassegmento vizinho

A expressão de *engrailed* é controlada por genes "pair-rule"

Mutantes sem *fushi-tarazu* não expressam *engrailed* nos segmentos pares (onde *ftz* é normalmente expresso)

A margem anterior do parassegmento é o limite de uma **restrição de linhagem celular**

Células de um parassegmento ou seus descendentes nunca se movem para um parassegmento vizinho

Domínios deste tipo com restrição de linhagem são conhecidos como **compartimentos**

A expressão de *engrailed* é controlada por genes "pair-rule"

Mutantes sem *fushi-tarazu* não expressam *engrailed* nos segmentos pares (onde *ftz* é normalmente expresso)

A margem anterior do parassegmento é o limite de uma **restrição de linhagem celular**


Células de um parassegmento ou seus descendentes nunca se movem para um parassegmento vizinho

Domínios deste tipo com restrição de linhagem são conhecidos como **compartimentos**

engrailed define o compartimento posterior do segmento


Estudo de compartimentos definidos por restrição de linhagens pode ser melhor observado em adultos

Estudo de compartimentos definidos por restrição de linhagens pode ser melhor observado em adultos



Linhagens podem ser estudadas por meio de mosaicos genéticos

Estudo de compartimentos definidos por restrição de linhagens pode ser melhor observado em adultos



Linhagens podem ser estudadas por meio de mosaicos genéticos


Para melhor visualizar os compartimentos pode-se usar a mutação *Minute*

Para melhor visualizar os compartimentos pode-se usar a mutação *Minute*

Mutantes *Minute* crescem mais devagar. Recombinação em células *Min/+* induz clones que crescem mais rápido e podem ser visualizados mais facilmente


Para melhor visualizar os compartimentos pode-se usar a mutação *Minute*

Mutantes *Minute* crescem mais devagar. Recombinação em células *Min/+* induz clones que crescem mais rápido e podem ser visualizados mais facilmente




Para melhor visualizar os compartimentos pode-se usar a mutação *Minute*

Mutantes *Minute* crescem mais devagar. Recombinação em células *Min/+* induz clones que crescem mais rápido e podem ser visualizados mais facilmente




Para melhor visualizar os compartimentos pode-se usar a mutação *Minute*


Mutantes *Minute* crescem mais devagar. Recombinação em células *Min/+* induz clones que crescem mais rápido e podem ser visualizados mais facilmente



Genes de segmentação estabilizam limites dos parassegmentos




Genes de segmentação estabilizam limites dos parassegmentos



Segmentos na parte ventral da larva possuem dentículos na parte anterior e são carecas na parte posterior

Genes de segmentação estabilizam limites dos parassegmentos




Segmentos na parte ventral da larva possuem dentículos na parte anterior e são carecas na parte posterior

Mutações em genes de segmentação alteram o padrão de dentículos:


wingless -> dentículos em todo o segmento. Parte posterior perdida e anterior duplicada especularmente

hedgehog -> mesmo fenótipo




Estabelecimento dos limites do parassegmento depende de um circuito de sinalização intercelular envolvendo os genes de segmentação *wingless*, *hedgehog* e *engrailed*

Estabelecimento dos limites do parassegmento depende de um circuito de sinalização intercelular envolvendo os genes de segmentação *wingless*, *hedgehog* e *engrailed*



Estabelecimento dos limites do parassegmento depende de um circuito de sinalização intercelular envolvendo os genes de segmentação *wingless*, *hedgehog* e *engrailed*




engrailed codifica um fator de transcrição, enquanto *Wingless* e *Hedgehog* são proteínas sinalizadoras secretadas

Wingless é o membro prototípico da **família Wnt**, com homólogos importantes no desenvolvimento de invertebrados e vertebrados


Wingless é o membro prototípico da **família Wnt**, com homólogos importantes no desenvolvimento de invertebrados e vertebrados

Hedgehog também possui homólogos em outros animais, incluindo vertebrados




Wingless é o membro prototípico da família **Wnt**, com homólogos importantes no desenvolvimento de invertebrados e vertebrados


Hedgehog também possui homólogos em outros animais, incluindo vertebrados





Wingless é o membro prototípico da família **Wnt**, com homólogos importantes no desenvolvimento de invertebrados e vertebrados

Hedgehog também possui homólogos em outros animais, incluindo vertebrados






<p>Wingless (Wg) and Hedgehog (Hh) feed back on each other; Wg also promotes expression of Engrailed (En)</p> <p>epidermal cells</p> <p>compartment boundary and anterior boundary of parasegment</p> <p>anterior compartment of segment</p> <p>posterior compartment of segment</p>	<p>In the absence of Wg activity, expression of Hh and En is lost—leading to a loss of segment polarity and pattern</p>	<p>Feedback de Wingless e Hedgehog mantêm a polaridade do segmento</p>



Wingless se move uma distância mais curta posteriormente do que anteriormente pois é mais rapidamente degradado no compartimento posterior



A epiderme de cada segmento no abdômem da drosófila adulta é dividida em um compartimento anterior e um posterior

Cada célula da epiderme de drosófila adquire uma polaridade antero-posterior individual

Cada célula da epiderme de drosófila adquire uma polaridade antero-posterior individual

Muitas células apresentam **polaridade celular plana** -> um lado da célula é diferente do outro

Cada célula da epiderme de drosófila adquire uma polaridade antero-posterior individual

Muitas células apresentam **polaridade celular plana** -> um lado da célula é diferente do outro

As células epidermais da asa de drosófila apresentam cerdas somente na parte **distal**


Cada célula da epiderme de drosófila adquire uma polaridade antero-posterior individual


Muitas células apresentam **polaridade celular plana** -> um lado da célula é diferente do outro

As células epidermais da asa de drosófila apresentam cerdas somente na parte **distal**


Qual o mecanismo pelo qual isso ocorre não está completamente estabelecido



Ao longo do tecido X forma um gradiente informacional em resposta a Hedgehog (Hh) e Wingless (Wg) nos limites dos compartimentos







Gradiente de Frizzled em azul e flechas orientação das cerdas. Clone de células sem Frizzled reverte o gradiente e a orientação das cerdas



Normal <i>Oncopeltus</i>	
Hair pattern	
 <p>A diagram showing a rectangular area divided by a vertical red line labeled 'Segment boundary'. The left side is labeled 'A' and the right side 'P'. The area is filled with small black dots representing hairs, which are oriented vertically on the left and horizontally on the right.</p>	
Gradient interpretation	
 <p>A diagram showing two adjacent triangles. The left triangle is labeled 'A' and the right one 'P'. The triangles are filled with orange and have a dashed line representing a gradient across the segment boundary.</p>	


Oncopeltus, hemíptero fitófago (=pulgão), tem um padrão de cerdas como drosófila

Em *Oncopeltus* alguns indivíduos tem um espaço no limite dos segmentos com cerdas de orientação alterada

Normal <i>Oncopeltus</i>	Abnormal hair pattern
Hair pattern	 <p>A micrograph showing a dense field of hairs. In the center, there is a distinct region where the hairs are oriented differently, forming a pattern that deviates from the normal orientation.</p>
Gradient interpretation	
 <p>A diagram showing two adjacent triangles labeled 'A' and 'P', filled with orange and having a dashed line representing a gradient across the segment boundary.</p>	

Oncopeltus, hemíptero fitófago (=pulgão), tem um padrão de cerdas como drosófila

Em *Oncopeltus* alguns indivíduos tem um espaço no limite dos segmentos com cerdas de orientação alterada




Oncopeltus, hemíptero fitófago (=pulgão), tem um padrão de cerdas como drosófila

Outros insetos usam mecanismos diferentes para estabelecer o padrão do corpo


Outros insetos usam mecanismos diferentes para estabelecer o padrão do corpo

Drosófila pertence a um grupo de insetos que apresentam **desenvolvimento de germe longo**



Outros insetos usam mecanismos diferentes para estabelecer o padrão do corpo


Drosófila pertence a um grupo de insetos que apresentam **desenvolvimento de germe longo**



Outros insetos como o besouro-da-farinha *Tribolium*, têm **desenvolvimento de germe curto**

Outros insetos usam mecanismos diferentes para estabelecer o padrão do corpo


Drosófila pertence a um grupo de insetos que apresentam **desenvolvimento de germe longo**



Outros insetos como o besouro-da-farinha *Tribolium*, têm **desenvolvimento de germe curto**

Outros insetos usam mecanismos diferentes para estabelecer o padrão do corpo


Drosófila pertence a um grupo de insetos que apresentam **desenvolvimento de germe longo**



Outros insetos como o besouro-da-farinha *Tribolium*, têm **desenvolvimento de germe curto**

Outros insetos usam mecanismos diferentes para estabelecer o padrão do corpo


Drosófila pertence a um grupo de insetos que apresentam **desenvolvimento de germe longo**




Outros insetos como o besouro-da-farinha *Tribolium*, têm **desenvolvimento de germe curto**

Nos insetos de germe curto a blastoderme é curta e forma somente os segmentos anteriores. Os segmentos posteriores são formados após a gastrulação.

Os mesmos genes estão envolvidos em ambos os padrões e especificam porções semelhantes



Os mesmos genes estão envolvidos em ambos os padrões e especificam porções semelhantes



Algumas vespas parasitas possuem uma embriogênese semelhante a de mamíferos!!!

Especificação da identidade do segmento

Cada segmento possui uma identidade única especificada por uma classe de genes reguladores mestres conhecidos como **genes homeióticos** seletores

Especificação da identidade do segmento

Cada segmento possui uma identidade única especificada por uma classe de genes reguladores mestres conhecidos como **genes homeióticos** seletores

Transformação homeiótica -> conversão de um segmento em outro, causada por mutações nos **genes Hox**


Especificação da identidade do segmento

Cada segmento possui uma identidade única especificada por uma classe de genes reguladores mestres conhecidos como **genes homeióticos** seletores


Transformação homeiótica -> conversão de um segmento em outro, causada por mutações nos **genes Hox**

Os genes Hox codificam fatores de transcrição e derivam o seu nome de um motivo no seu DNA, a **homeobox**, que codifica parte do sítio de ligação ao DNA destas proteínas chamada de **homeodomínio**


Os dois conjuntos de genes Hox de drosófila são chamados de complexo bithorax e Antennapedia



Os dois conjuntos de genes Hox de drosófila são chamados de complexo bithorax e Antennapedia



Mutações nos genes homeióticos resultam em **homeiose** -> transformação de todo um segmento ou estrutura em uma relacionada, p. ex. antena em pata



Genes
homeióticos
foram
descobertos
também em
vertebrados

O complexo bithorax controla o desenvolvimento dos parassegmentos 5-14 enquanto Antennapedia controla a identidade dos parassegmentos mais anteriores

O complexo bithorax controla o desenvolvimento dos parassegmentos 5-14 enquanto Antennapedia controla a identidade dos parassegmentos mais anteriores

O complexo bithorax compreende três genes homeióticos:

O complexo bithorax controla o desenvolvimento dos parassegmentos 5-14 enquanto Antennapedia controla a identidade dos parassegmentos mais anteriores

O complexo bithorax compreende três genes homeióticos:

Ultrabithorax é expresso nos parassegmentos 5 a 12

O complexo bithorax controla o desenvolvimento dos parassegmentos 5-14 enquanto Antennapedia controla a identidade dos parassegmentos mais anteriores

O complexo bithorax compreende três genes homeióticos:

Ultrabithorax é expresso nos parassegmentos 5 a 12

abdominal-A é expresso nos parassegmentos 7-13

O complexo bithorax controla o desenvolvimento dos parassegmentos 5-14 enquanto Antennapedia controla a identidade dos parassegmentos mais anteriores

O complexo bithorax compreende três genes homeióticos:

Ultrabithorax é expresso nos parassegmentos 5 a 12

abdominal-A é expresso nos parassegmentos 7-13

Abdominal-B é expresso do parassegmento 10 para trás

O complexo bithorax controla o desenvolvimento dos parassegmentos 5-14 enquanto Antennapedia controla a identidade dos parassegmentos mais anteriores

O complexo bithorax compreende três genes homeióticos:

Ultrabithorax é expresso nos parassegmentos 5 a 12

abdominal-A é expresso nos parassegmentos 7-13

Abdominal-B é expresso do parassegmento 10 para trás

A combinação da expressão diferente desses três genes estabelece a identidade do parassegmento

A combinação da expressão diferente desses três genes estabelece a identidade do parassegmento

Abdominal-B suprime *Ultrabithorax*, de modo que a expressão de *Ultrabithorax* diminui em direção ao parassegmento 14, a medida que a expressão de *Abd-B* aumenta

A combinação da expressão diferente desses três genes estabelece a identidade do parassegmento


Abdominal-B suprime *Ultrabithorax*, de modo que a expressão de *Ultrabithorax* diminui em direção ao parassegmento 14, a medida que a expressão de *Abd-B* aumenta

A expressão dos genes bithorax é controlada por "gap" e "pair-rule genes"

A combinação da expressão diferente desses três genes estabelece a identidade do parassegmento

Abdominal-B suprime *Ultrabithorax*, de modo que a expressão de *Ultrabithorax* diminui em direção ao parassegmento 14, a medida que a expressão de *Abd-B* aumenta

A expressão dos genes bithorax é controlada por "gap" e "pair-rule genes"




Mutações no complexo bithorax afetam o desenvolvimento das asas e balancins no adulto

A combinação da expressão diferente desses três genes estabelece a identidade do parassegmento

Abdominal-B suprime *Ultrabithorax*, de modo que a expressão de *Ultrabithorax* diminui em direção ao parassegmento 14, a medida que a expressão de *Abd-B* aumenta

A expressão dos genes bithorax é controlada por "gap" e "pair-rule genes"




Mutações no complexo bithorax afetam o desenvolvimento das asas e balancins no adulto


A combinação da expressão diferente desses três genes estabelece a identidade do parassegmento


Abdominal-B suprime *Ultrabithorax*, de modo que a expressão de *Ultrabithorax* diminui em direção ao parassegmento 14, a medida que a expressão de *Abd-B* aumenta

A expressão dos genes bithorax é controlada por "gap" e "pair-rule genes"





Mutações no complexo bithorax afetam o desenvolvimento das asas e balancins no adulto








O complexo bithorax é essencial para a diversificação dos segmentos, cujo padrão básico é representado pelo parassegmento 4



O complexo bithorax é essencial para a diversificação dos segmentos, cujo padrão básico é representado pelo parassegmento 4





O caráter dos parassegmentos é especificado pelos genes do complexo bitórax agindo de maneira combinada

O caráter dos parassegmentos é especificado pelos genes do complexo bitórax agindo de maneira combinada

As proteínas dos "gap genes" e os "pair rule genes" desaparecem após 4h. A expressão contínua e correta dos genes homeióticos envolve dois grupos de genes: Polycomb e Trithorax

O caráter dos parassegmentos é especificado pelos genes do complexo bitórax agindo de maneira combinada

As proteínas dos "gap genes" e os "pair rule genes" desaparecem após 4h. A expressão contínua e correta dos genes homeióticos envolve dois grupos de genes: Polycomb e Trithorax

As proteínas do **grupo Polycomb** mantêm repressão transcricional dos genes homeióticos onde eles estão desligados

O caráter dos parassegmentos é especificado pelos genes do complexo bitórax agindo de maneira combinada

As proteínas dos "gap genes" e os "pair rule genes" desaparecem após 4h. A expressão contínua e correta dos genes homeióticos envolve dois grupos de genes: Polycomb e Trithorax

As proteínas do **grupo Polycomb** mantêm repressão transcricional dos genes homeióticos onde eles estão desligados

Proteínas do **grupo Trithorax** mantem a expressão nas células onde eles estão ligados

O caráter dos parassegmentos é especificado pelos genes do complexo bitórax agindo de maneira combinada

As proteínas dos "gap genes" e os "pair rule genes" desaparecem após 4h. A expressão contínua e correta dos genes homeióticos envolve dois grupos de genes: Polycomb e Trithorax

As proteínas do **grupo Polycomb** mantêm repressão transcricional dos genes homeióticos onde eles estão desligados

Proteínas do **grupo Trithorax** mantem a expressão nas células onde eles estão ligados


Os genes controlados pelas proteínas homeióticas são quase todos desconhecidos

A ordem de expressão dos genes Hox corresponde à ordem dos genes no cromossomo

A ordem de expressão dos genes Hox corresponde à ordem dos genes no cromossomo

Utilização de elementos P e Gal4 para análise de promotores específicos

"Enhancer trap"



Evolução funcional de módulos reguladores em cis (CRM) num gene homeiótico de drosófila

Evolução funcional de módulos reguladores em cis (CRM) num gene homeiótico de drosófila

A taxa de evolução de uma dada sequência de DNA é inversamente relacionada ao nível de "coação" funcional. Isso está bem estabelecido para os genes homeióticos.

Ho et al., PLoS Genet. 5(11): e1000709. doi:10.1371/journal.pgen.1000709, 2009.


Evolução funcional de módulos reguladores em cis (CRM) num gene homeiótico de drosófila

A taxa de evolução de uma dada sequência de DNA é inversamente relacionada ao nível de "coação" funcional. Isso está bem estabelecido para os genes homeióticos.

Enquanto a conservação geral da sequência de DNA nos CRMs de drosófila não é diferente das regiões genômicas vizinhas, sítios críticos para fatores de transcrição dentro dessas CRMs são bastante conservados.


Ho et al., PLoS Genet. 5(11): e1000709. doi:10.1371/journal.pgen.1000709, 2009.

CRMs na região 3' do gene *Abdominal-B*




Ho et al., PLoS Genet. 5(11): e1000709. doi:10.1371/journal.pgen.1000709, 2009.

CRMs na região 3' do gene *Abdominal-B*




Ho et al., PLoS Genet. 5(11): e1000709. doi:10.1371/journal.pgen.1000709, 2009.

CRMs na região 3' do gene *Abdominal-B*







Ho et al., PLoS Genet. 5(11): e1000709. doi:10.1371/journal.pgen.1000709, 2009.

CRMs na região 3' do gene *Abdominal-B*




Ho et al., PLoS Genet. 5(11): e1000709. doi:10.1371/journal.pgen.1000709, 2009.





Ação do "enhancer" IAB5 de diferentes espécies na expressão de *eve-lacZ* em embriões transgênicos de *melanogaster*



Ho et al., PLoS Genet. 5(11): e1000709. doi:10.1371/journal.pgen.1000709, 2009.